

IBATOX

AMITRAZ 12,5%

CARRAPATICIDA, SARNICIDA, PIOLHICIDA



USO VETERINÁRIO

FÓRMULA: Cada 100 ml do produto contém:

Amitraz.....	12,50 g
Veículoq.s.p.....	100,00 ml

INDICAÇÕES: No combate aos carrapatos, atuando nos diferentes estágios do ciclo evolutivo, inclusive como ovicida. Excelente ectoparasiticida, combatendo principalmente o carrapato *Boophilus microplus* de bovinos. Em ovinos e suínos, combate os ectoparasitas como a sarna e piolhos (*Psoroptes* spp, *Melophagus ovinus*). Também atua contra ectoparasitas dos caninos, como carrapatos, sarna (*Demodex canis*) e piolhos. Carrapaticida e sarnicida especialmente indicado quando há resistência a produtos organofosforados e piretróides.

MODO DE USAR: Somente uso externo. Diluir o produto apenas no momento do uso utilizando luvas.

BOVINOS: Diluir 20 ml de Ibattox em 10 litros de água, 40 ml em 20 litros de água ou 200 ml em 100 litros de água. Preparar a mistura previamente em um balde e depois despejar no pulverizador, que deve ter um jato com bastante pressão para que a solução penetre debaixo dos pelos onde estão alojados os carrapatos. O consumo de líquido por animal não deve ser inferior a 5 litros e devem ser feitas duas aplicações com intervalo de 21 dias entre elas.

CANINOS: Diluir 20 ml de Ibattox em 10 litros de água, 40 ml em 20 litros de água ou 200 ml em 100 litros de água. Banhar o animal evitando contato com os olhos, boca e focinho. Na região facial aplicar com o auxílio de um chumaço de algodão. Deixar o produto agir durante 1 hora, não permitindo que o animal lamba a pelagem úmida nem fique exposto ao sol. O enxágue deve ser feito com água e xampu ou sabonete neutro. Realizar dois banhos com intervalo de 14 dias entre eles, utilizando nova calda.

OVINOS: Diluir 20 ml de Ibattox em 5 litros de água, 40 ml em 10 litros de água ou 200 ml em 50 litros de água. Preparar a mistura previamente em um balde e depois despejar na carga do banheiro. A duração do banho deve ser de, no mínimo, 1 minuto com imersões profundas da cabeça. Realizar dois banhos com intervalo de 10 a 12 dias entre eles, utilizando nova calda no segundo banho. Para recarga, utilizar 200 ml de Ibattox em 25 litros de água.

SUÍNOS: Diluir 20 ml de Ibattox em 5 litros de água, 40 ml em 10 litros de água ou 200 ml em 50 litros de água. Preparar a mistura previamente em um balde e após despejar no pulverizador que deve ter um jato com bastante pressão para que a solução penetre debaixo dos pelos onde estão alojados os carrapatos. O consumo de líquido por animal não deve ser inferior a 2 litros. Repetir a aplicação após 14 dias.

PRECAUÇÕES: Não deixar o animal lamber a pelagem úmida com o produto. Durante e após o banho com Ibattox, não deixar o animal ao sol. Aplicar o produto no animal em local ventilado. Não banhar quando há ameaça de chuva ou calor intenso. Usar pulverização para animais menores devido ao risco de afogamento em banheiro. Não reutilizar as embalagens vazias. Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene

e de uso doméstico. Evitar contato do produto concentrado com a pele, caso aconteça, lavar bem com água e sabão. O componente ativo do Ibatox (amitraz), quando introduzido no organismo causa depressão do sistema nervoso central, devendo ser administrado tratamento analéptico sintomático. Caso tenha ocorrido ingestão acidental, provocar vômito administrando, por via oral, uma colher de sopa de sal (cloreto de sódio) em um copo de água morna.

CONTRAINDICAÇÕES: Não administrar em felinos. Animais cansados, fêmeas em gestação e animais que fazem uso de medicamentos inibidores da monoamino oxidase (tranilcipromina, fenelzina e isocarboxazida), mepiridina e aminas simpatomiméticas (isoproterenol). Evitar a administração em animais portadores de cardiopatias e diabetes mellitus.

EFEITOS ADVERSOS: Em animais sensíveis, a formulação pode causar dermatite de contato, sedação transitória, depressão da temperatura retal, elevação da glicemia e convulsões.

SINAIS DE INTOXICAÇÃO: Pode ocorrer intoxicação de baixa letalidade, principalmente decorrente de erros na administração do produto, cujas manifestações incluem bradicardia, ataxia, depressão, desorientação, vômitos, anorexia, poliúria e diarreia. Alguns animais apresentam sedação transitória 2 a 6 horas após o tratamento que geralmente desaparece entre 24 e 72 horas.

CONDUTA NA INTOXICAÇÃO: Não há antídoto específico, recomendam-se as seguintes medidas: Banhar o animal com água e sabão; Administrar eméticos, carvão ativado ou catárticos salinos; Monitorar a temperatura do animal, para evitar risco de hipotermia; Se necessário, encaminhar ao médico veterinário e iniciar terapia de suporte à base de diazepam ou outro tranquilizante fenotiazínico.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS E OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Conservar o produto em local fresco, arejado, longe do fogo e fora do alcance de crianças e animais. Produto Inflamável.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.



**CUIDADO
VENENO**

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SOB Nº 3.761/91 EM 02/07/1991.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
VALESCA BORBA - CRF/RS 4355

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



LABORATÓRIO IBASA LTDA
Rua Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil
CNPJ: 91.850.875/0001-38
www.laboratorioibasa.com
SAC: 0800.541217