

# CETOCONAZOL

SUSPENSÃO ORAL 20%

ANTIFÚNGICO DE AMPLO ESPECTRO



USO VETERINÁRIO

## FÓRMULA:

Cada 100 ml do produto contém:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Cetoconazol.....    | 20,0 g   |
| Veículo q.s.p. .... | 100,0 ml |

**INDICAÇÕES:** O Cetoconazol tem atividade fungistática e é utilizado em cães e gatos no tratamento de infecções fúngicas locais na pele, pelos, unhas, mucosas ou sistêmicas, como as relacionadas a seguir:

- Dermatites (*Malassezia pachidermatis*).
- Dermatofitose (*Trichophyton sp*, *Epidermophyton sp* e *Microsporum sp*).
- Candidíase cutânea e de mucosas (*Candida albicans* e outras espécies do mesmo gênero).

## POSOLOGIA E MODO DE USAR:

- Agitar bem antes de usar.
- 1 ml equivale a 20 gotas do produto.
- Cada gota do produto contém 10 mg de Cetoconazol.
- Administrar a suspensão a cães e gatos por via oral: 2 a 4 gotas por kg de peso (cães) e 1 gota por kg de peso (gatos).

| ESPÉCIE    | DOSE              |
|------------|-------------------|
| Cães.....  | 20 a 40 mg/kg/dia |
| Gatos..... | 10 mg/kg/dia      |

•Administrar apenas uma vez ao dia (dose única diária) antes ou com o alimento. Evitar a ingestão concomitante de leite ou outras substâncias com antiácidos, anticolinérgicos e anti-histamínicos bloqueadores H2 que diminuem a secreção gástrica e a absorção do Cetoconazol.

•A duração do tratamento não deve ser inferior a 40 dias e a cura deve ser verificada pelo médico veterinário através de exames laboratoriais.

## PRECAUÇÕES:

- O Cetoconazol é extensivamente metabolizado através do fígado e rins e não deve ser administrado em animais com insuficiência renal ou hepática.
- Administrar com cautela em filhotes e animais idosos.
- A critério do médico veterinário, a dose diária total pode ser fracionada em 2 tomadas.

## EFEITOS COLATERAIS:

- Efeitos colaterais mais comuns em cães e gatos incluem inapetência, prurido, alopecia e um clareamento reversível do pelo.
- Gatos são mais sensíveis ao cetoconazol do que cães e sinais de intoxicação incluem anorexia, febre, depressão e diarreia.
- Doses diárias de até 50 mg ou terapia em dias alternados reduzem a possibilidade de intoxicação em felinos.
- Caso o animal apresente algum efeito colateral ou sinal de intoxicação, comunicar ao médico veterinário.

**CONTRAINDICAÇÕES:** O Cetoconazol atravessa a barreira placentária e os tecidos fetais tendo efeito embriotóxico, não devendo ser administrado a fêmeas prenhes e lactantes.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:** Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SOB Nº 8.045/01 EM 14/12/2001

RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
MELISSA CRESTANI - CRF/RS 8153

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



LABORATÓRIO IBASA LTDA  
Rua Almirante Tamandaré, 530  
Porto Alegre - RS - Brasil  
CNPJ: 91.850.875/0001-38  
www.ibasa.com.br  
SAC: 0800.5412137

# CETOCONAZOL

SUSPENSIÓN ORAL 20%

ANTIFÚNGICO DE AMPLIO ESPECTRO



USO VETERINARIO

**FÓRMULA:** Cada 100 ml de producto contiene:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ketoconazol.....  | 20,0 g   |
| Vehículo cbs..... | 100,0 ml |

**INDICACIONES:** El ketoconazol tiene acción fungistática y se utiliza en perros y gatos para el tratamiento de infecciones fúngicas en la piel, el pelo, las uñas, las mucosas o de infecciones sistémicas, como las que se describen a continuación:

- Dermatitis (*Malassezia pachidermatis*).
- Dermatofitosis (*Trichophyton* sp, *Epidermophyton* sp y *Microsporum* sp).
- Candidiasis cutánea y de mucosas (*Candida albicans* y otras especies del mismo género).

### POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

- Agitar bien antes de usar.
- 1 ml equivale a 20 gotas del producto.
- Cada gota del producto contiene 10 mg de ketoconazol.
- Administrar la suspensión a perros y gatos por vía oral: 2 a 4 gotas por kg de peso (perros) y 1 gota por kg de peso (gatos).

| ESPECIE     | DOSIS             |
|-------------|-------------------|
| Perros..... | 20 a 40 mg/kg/día |
| Gatos.....  | 10 mg/kg/día      |

• Administrar solamente una vez por día (dosis única diaria) antes o con el alimento. Evitar la ingestión concomitante de leche u otras sustancias con antiácidos, anticolinérgicos y antihistamínicos bloqueadores H<sub>2</sub>, que disminuyen la secreción gástrica y la absorción de ketoconazol.

• La duración del tratamiento no debe ser inferior a 40 días y la cura debe ser verificada por el médico veterinario a través de exámenes de laboratorio.

### PRECAUCIONES:

- El ketoconazol se metaboliza extensivamente a través del hígado y de los riñones y no se debe administrar en animales con insuficiencia renal o hepática.
- Administrar con cautela en cachorros y animales de edad.
- A criterio del médico veterinario, la dosis diaria total se puede fraccionar en 2 tomas.

### EFFECTOS COLATERALES:

- Los efectos colaterales más comunes en perros y gatos incluyen inapetencia, prurito, alopecia y un aclaramiento reversible del pelo.
- Los gatos son más sensibles al ketoconazol que los perros y los signos de intoxicación incluyen anorexia, fiebre, depresión y diarrea.
- Las dosis diarias de hasta 50 mg o el tratamiento en días alternados reducen la posibilidad de intoxicación en felinos.
- En caso de que el animal presente algún efecto colateral o una señal de intoxicación, esto se debe comunicar al médico veterinario.

**CONTRAINDICACIONES:** El ketoconazol atraviesa la barrera placentaria y los tejidos fetales y tiene efecto embriotóxico, por lo que no debe administrarse a hembras preñadas y lactantes.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Conservar en lugar seco y fresco, al resguardo de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. Conservar entre 15°C y 30°C.

### VENTA BAJO RECETA DEL MÉDICO VETERINARIO.

Propietario y fabricante:  
**LABORATORIO IBASA LTDA**  
R. Almirante Tamandaré, 530  
Porto Alegre -RS- Brasil

Importado y distribuido por:  
**NUVETEC S.R.L.**  
Av. José J. Sanches esq. 2 de Mayo.  
Km 4. Ciudad del Este  
Paraguay. Tel: (595) 61 578183  
Responsable Técnica:  
M. V. Andrea Bisolo - Reg: 1514

Distribuido por: **DIBASA S.R.L.**  
San Martín c/ Pedro J. Caballero  
Luque. Tel: 021 653135  
**REG. SENACSA: 13057**