

DIPIRONA

IBASA 50%

ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO



USO VETERINÁRIO

A DIPIRONA, um derivado solúvel da pirazolona, tem ação analgésica e antipirética e pertence à classe dos anti-inflamatórios não-esteróides. A ação antipirética e analgésica da Dipirona tem seus efeitos em nível hipotalâmico, no centro termorregulador da temperatura corporal, e influencia na síntese das prostaglandinas e enzimas proteolíticas. Seu uso injetável é particularmente conveniente por sua elevada solubilidade em água.

FÓRMULA:

Cada 100 ml do produto contém:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Dipirona sódica | 50,00 g |
| Veículo q.s.p. | 100,00 ml |

INDICAÇÕES: Indicada para bovinos, caninos, caprinos, equinos, felinos, ovinos e suínos para alívio de dores musculares, cólicas, processos inflamatórios, febre e após intervenções cirúrgicas. Auxiliar no tratamento de pneumonias, bronquites, nefrites, cistites, entre outros processos infecciosos.

POSOLOGIA E MODO DE USAR: Dipirona IBASA 50% pode ser aplicada pela via intramuscular ou endovenosa. O local de injeção no animal deve ser previamente desinfetado.
•Bovinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos: 1 ml para cada 10 kg de peso (50 mg/kg).
•Caninos e felinos: 0,6 ml para cada 10 kg de peso (30 mg/kg).
Administrar a cada 12 horas até o desaparecimento dos sintomas ou a critério do médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES: Dipirona IBASA 50% está contraindicada em animais hipersensíveis ao medicamento pela possibilidade de ocorrência de choque anafilático quando da administração endovenosa. O produto também não deve ser administrado em animais que apresentam insuficiências cardíaca, hepática ou renal.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

EQUINOS E SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e manter fora do alcance de crianças e animais.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SOB Nº 6867/99 EM 15/04/1999.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
MELISSA CRESTANI - CRF/RS 8153

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



LABORATÓRIO IBASA LTDA
Rua Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil
CNPJ: 91.850.875/0001-38
www.ibasa.com.br
SAC: 0800.5412137

DIPIRONA

IBASA 50%

ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO



USO VETERINARIO

La DIPIRONA, un derivado soluble de la pirazolona, tiene acción analgésica y antipirética y pertenece a la clase de los antiinflamatorios no esteroideos. La acción antipirética y analgésica de la Dipirona tiene sus efectos a nivel hipotalámico, en el centro termoregulador de la temperatura corporal, e influencia en la síntesis de las prostaglandinas y encimas proteolíticas. Su uso inyectable es particularmente conveniente por su elevada solubilidad en agua.

FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Dipirona sódica | 50,00 g |
| Vehículo q.s.p. | 100,00 ml |

INDICACIONES: Indicada para ganado, caninos, caprinos, equinos, felinos, ovinos e porcinos para alivio de dolores musculares, cólicas, procesos inflamatorios, fiebre y post intervenciones quirúrgicas. Auxiliar en el tratamiento de neumonías, bronquitis, nefritis y cistitis, entre otros procesos infecciosos.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO: Dipirona IBASA 50% puede ser aplicada por vía intramuscular o intravenosa. El local de inyección en el animal debe ser previamente desinfectado.
•Ganado, caprinos, equinos, ovinos y porcinos: 1 ml por cada 10 kg de peso (50 mg/kg).
•Caninos y felinos: 0,6 ml por cada 10 kg de peso (30 mg/kg).
Administrar cada 12 horas hasta que desaparezcan los síntomas o a criterio del veterinario.

CONTRAINDICACIONES: Dipirona IBASA 50% es contraindicada en animales hipersensibles al medicamento por la posibilidad de ocurrir choque anafiláctico después de administración intravenosa. El producto no debe ser administrado en animales que presenten insuficiencia cardiaca, hepática o renal.

ATENCIÓN: RESPETAR LOS SIGUIENTES PERIODOS DE PRIVACIÓN
GANADO, CAPRINOS Y OVINOS: MATANZA - LA MATANZA DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADA 1 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. LECHE - LA LECHE DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO NO DEBE SER DESTINADA AL CONSUMO HUMANO HASTA 1 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

EQUINOS Y PORCINOS: MATANZA - LA MATANZA DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADA 1 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. EL USO DEL PRODUCTO EN DIFERENTES CONDICIONES DE CÓMO SE INDICA EN ESTE PROSPECTO PUEDE CAUSAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS POR ENCIMA DE LOS LÍMITES, CONVIRTIENDO EL ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL INADECUADO PARA EL CONSUMO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en un lugar seco y fresco, lejos de la luz del sol y mantener fuera del alcance de los niños y animales. Almacene a 15° C y 30° C.

VENTA BAJO RECETA Y APLICACIÓN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL MÉDICO VETERINARIO.

Propietario y fabricante:
LABORATORIO IBASA LTDA
R. Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil

Importado y distribuido por:
NUVETEC S.R.L.
Av. José J. Sanches esq. 2 de Mayo.
Km 4. Ciudad del Este
Paraguay. Tel: (595) 61 578183
Responsable Técnica:
M. V. Andrea Bisolo - Reg: 1514

Distribuido por: **DIBASA S.R.L.**
San Martín c/ Pedro J. Caballero
Luque. Tel: 021 653135
REG. SENACSA: XXXXX