

IBATOX

AMITRAZ 12,5%

CARRAPATICIDA, SARNICIDA, PIOLHICIDA



USO VETERINÁRIO

FÓRMULA: Cada 100 ml do produto contém:

Amitraz.....	12,50 g
Veículo q.s.p.....	100,00 ml

INDICAÇÕES: No combate aos carrapatos, atuando nos diferentes estágios do ciclo evolutivo, inclusive como ovidica. Excelente ectoparasiticida, combatendo principalmente o carrapato *Boophilus microplus* de bovinos. Em ovinos e suínos, combate os ectoparasitas como a sarna e piolhos (*Psoroptes spp.*, *Melophagus ovinus*). Também atua contra ectoparasitas dos caninos, como carrapatos, sarna (*Demodex canis*) e piolhos. Carrapaticida e sarnicida especialmente indicado quando há resistência a produtos organofosforados e piretróides.

MODO DE USAR: Somente uso externo. Diluir o produto apenas no momento do uso utilizando luvas.

BOVINOS: Diluir 20 ml de Ibatox em 10 litros de água, 40 ml em 20 litros de água ou 200 ml em 100 litros de água. Preparar a mistura previamente em um balde e depois despejar no pulverizador, que deve ter um jato com bastante pressão para que a solução penetre debaixo dos pelos onde estão alojados os carrapatos. O consumo de líquido por animal não deve ser inferior a 5 litros e devem ser feitas duas aplicações com intervalo de 21 dias entre elas. **CANINOS:** Diluir 20 ml de Ibatox em 10 litros de água, 40 ml em 20 litros de água ou 200 ml em 100 litros de água. Banhar o animal evitando contato com os olhos, boca e focinho. Na região facial aplicar com o auxílio de um chumaço de algodão. Deixar o produto agir durante 1 hora, não permitindo que o animal lamba a pelagem úmida nem fique exposto ao sol. O enxágue deve ser feito com água e xampu ou sabonete neutro. Realizar dois banhos com intervalo de 14 dias entre eles, utilizando nova calda. **OVINOS:** Diluir 20 ml de Ibatox em 5 litros de água, 40 ml em 10 litros de água ou 200 ml em 50 litros de água. Preparar a mistura previamente em um balde e depois despejar na carga do banheiro. A duração do banho deve ser de, no mínimo, 1 minuto com imersões profundas da cabeça. Realizar dois banhos com intervalo de 10 a 12 dias entre eles, utilizando nova calda para o segundo banho. Para recarga, utilizar 200 ml de Ibatox em 25 litros de água. **SUÍNOS:** Diluir 20 ml de Ibatox em 5 litros de água, 40 ml em 10 litros de água ou 200 ml em 50 litros de água. Preparar a mistura previamente em um balde e após despejar no pulverizador que deve ter um jato com bastante pressão para que a solução penetre debaixo dos pelos onde estão alojados os carrapatos. O consumo de líquido por animal não deve ser inferior a 2 litros. Repetir a aplicação após 14 dias.

PRECAUÇÕES: Não deixar o animal lamber a pelagem úmida com o produto. Durante e após o banho com Ibatox, não deixar o animal ao sol. Aplicar o produto no animal em local ventilado. Não banhar quando há ameaça de chuva ou calor intenso. Usar pulverização para animais menores devido ao risco de afogamento em banheiro. Não reutilizar as embalagens vazias. Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e de uso doméstico. Evitar contato do produto concentrado com a pele, caso aconteça, lavar bem com água e sabão. O componente ativo do Ibatox (amitraz), quando introduzido no organismo causa depressão do sistema nervoso central, devendo ser administrado tratamento analéptico sintomático. Caso tenha ocorrido ingestão acidental, provocar vômito administrando, por via oral, uma colher de sopa de sl (cloreto de sódio) em um copo de água morna.

CONTRAINDICAÇÕES: Não administrar em felinos. Animais cansados, fêmeas em gestação e animais que fazem uso de medicamentos inibidores da monoamino oxidase (tranilcipromina, fenelzina e isocarboxazida), mepiridina e aminas simpatomiméticas (isoproterenol). Evitar a administração em animais portadores de cardiopatias e diabetes mellitus.

EFEITOS ADVERSOS: Em animais sensíveis, a formulação pode causar dermatite de contato, sedação transitória, depressão da temperatura retal, elevação da glicemia e convulsões.

SINAIS DE INTOXICAÇÃO: Pode ocorrer intoxicação de baixa letalidade, principalmente decorrente de erros na administração do produto, cujas manifestações incluem bradicardia, ataxia, depressão, desorientação, vômitos, anorexia, poliúria e diarreia. Alguns animais apresentam sedação transitória 2 a 6 horas após o tratamento que geralmente desaparece entre 24 e 72 horas.

CONDUTA NA INTOXICAÇÃO: Não há antídoto específico, recomendam-se as seguintes medidas: banhar o animal com água e sabão; administrar eméticos, carvão ativado ou catárticos salinos; monitorar a temperatura do animal, para evitar risco de hipotermia; se necessário, encaminhar ao médico veterinário e iniciar terapia de suporte à base de diazepam ou outro tranquilizante fenotiazínico.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS E OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Conservar o produto em local fresco, arejado, longe do fogo e fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.



LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SOB Nº 3.761/91 EM 02/07/1991.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
MELISSA CRESTANI - CRF/RS 8153

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



LABORATÓRIO IBASA LTDA
Rua Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil
CNPJ: 91.850.875/0001-38
www.ibasa.com.br
SAC: 0800.5412137

IBATOX

AMITRAZ 12,5%



ACTÚA CONTRA GARRAPATAS, SARNA Y PIOJOS



USO VETERINARIO

FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:

Amitraz.....	12,50 g
Vehículo q.s.p.	100,00 ml

INDICACIONES: IBATOX es indicado en el combate a las garrapatas, actuando en las diferentes etapas del ciclo evolutivo, inclusive como ovcida. Excelente ectoparasiticida, combatiendo principalmente la garrapata *Boophilus microplus* de bovinos. En ovinos y porcinos combate los ectoparásitos como la sarna y piojos (*Psoroptes spp*, *Melophagus ovinus*). También actúa contra ectoparásitos de los caninos, como garrapatas, sarna (*Demodex canis*) y piojos. Garrapaticida y sarnicida especialmente indicado cuando hay resistencia a productos organofosforados y piretroides.

MODO DE USO: Solamente uso externo. Diluir el producto sólo en el momento de uso utilizando guantes.

BOVINOS: Diluir 20 ml de Ibattox en 10 litros de agua, 40 ml en 20 litros de agua o 200 ml en 100 litros de agua. Preparar la mezcla previamente en un balde y después despejar en el pulverizador, que debe poseer un chorro con bastante presión para que la solución penetre debajo de los pelos donde están alojadas las garrapatas. El consumo de líquido por animal no debe ser inferior a 5 litros y deben ser hechas dos aplicaciones con intervalo de 21 días entre ellas. **CANINOS:** Diluir 20 ml de Ibattox en 10 litros de agua, 40 ml en 20 litros de agua o 200 ml en 100 litros de agua. Bañar al animal evitando contacto con los ojos, boca y hocico. En la región facial aplicar con auxilio de una bola de algodón. Dejar el producto actuar durante 1 hora, no permitiendo que el animal lama el pelaje húmedo ni se quede expuesto al sol. El enjuague debe ser hecho con agua y shampoo o jabón neutro. Realizar dos baños con intervalo de 14 días entre ellos, utilizando nueva calda.

OVINOS: Diluir 20 ml de Ibattox en 5 litros de agua, 40 ml en 10 litros de agua o 200 ml en 50 litros de agua. Preparar la mezcla previamente en un balde y después despejar en la descarga del baño. La duración del baño debe ser de, mínimo, 1 minuto con inmersiones profundas de la cabeza. Realizar dos baños con intervalo de 10 a 12 días entre ellos, utilizando nueva calda en el segundo baño. Para recarga, utilizar 200 mL de Ibattox en 25 litros de agua. **PORCINOS:** Diluir 20 ml de Ibattox en 5 litros de agua, 40 ml en 10 litros de agua o 200 ml en 50 litros de agua. Preparar la mezcla previa en un balde y después despejar en el pulverizador, que debe poseer un chorro con bastante presión para que la solución penetre debajo de los pelos donde están alojadas las garrapatas. El consumo de líquido por animal no debe ser inferior a 2 litros. Repetir la aplicación luego de 14 días.

PRECAUCIONES: No dejar el animal lamer el pelaje húmedo con el producto. Durante y después del baño con Ibattox, no dejar el animal al sol. Aplicar el producto en el animal en lugar ventilado. No bañar cuando haya amenaza de lluvia o calor intenso. Usar pulverización para animales menores debido al riesgo de ahogamiento en baño. No reutilizar el embalaje vacío. No guardar ni aplicar el producto junto a alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y de uso doméstico. Evitar contacto del producto concentrado con la piel; caso acontezca, lavar bien con agua y jabón. El componente activo del Ibattox (amitraz), después de introducido en el organismo, causa depresión del sistema nervioso central, debiendo ser administrado tratamiento analéptico sintomático. Caso haya ocurrido ingestión accidental, provocar vómito administrando, por vía oral, una cucharada de sopa de sal (cloreto de sodio) en un vaso de agua tibia.

CONTRAINDICACIONES: No administrar en felinos. Animales cansados, hembras en gestación y animales que hacen uso de medicamentos inhibidores de la monoamino oxidasa (tranilcipromina, fenelzina e isocarboxazida), mepiridina y aminas simpatomiméticas (isoproterenol). Evitar la administración en animales portadores de cardiopatías y diabetes mellitus.

EFFECTOS ADVERSOS: En animales sensibles la formulación puede provocar dermatitis de contacto, sedación transitoria, depresión de la temperatura rectal, aumento de glicemia y convulsiones.

SEÑALES DE INTOXICACIÓN: Puede ocurrir intoxicación de baja letalidad, principalmente derivada de errores en la administración del producto cuyas manifestaciones incluyen bradicardia, ataxia, depresión, somnolencia, desorientación, vómitos, anorexia, poliúria y diarrea. Algunos animales presentan sedación transitoria 2 a 6 horas luego del tratamiento que generalmente desaparece entre 24 y 72 horas.

CONDUCTA EN LA INTOXICACIÓN: No hay antídoto específico, se recomiendan las siguientes medidas: bañar al animal con agua y jabón; administrar eméticos, carvón activado o catárticos salinos; monitorear la temperatura del animal para evitar riesgo de hipotermia; si fuera necesario, encaminar al médico veterinario e iniciar terapia de soporte a base de Diazepam u otro tranquilizante fenotiazínico.

ATENCIÓN: RESPETAR LOS SIGUIENTES PERIODOS DE PRIVACIÓN

BOVINOS Y OVINOS: MATANZA - LA MATANZA DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADA 14 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. LECHE - LA LECHE DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO NO DEBE SER DESTINADA AL CONSUMO HUMANO HASTA 1 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

PORCINOS: MATANZA - LA MATANZA DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADA 14 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN.

EL USO DEL PRODUCTO EN DIFERENTES CONDICIONES DE CÓMO SE INDICA EN ESTE PROSPECTO PUEDE CAUSAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS POR ARRIBA DE LOS LÍMITES, CONVIRTIENDO EL ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL NO ADECUADO PARA EL CONSUMO.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en un lugar seco, fresco y ventilado, lejos del fuego y fuera del alcance de niños y animales. Producto inflamable. Almacene a 15°C y 30°C.

VENTA BAJO RECETA Y APLICACIÓN CON INDICACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.



CUIDADO
VENENO

Propietario y fabricante:
LABORATÓRIO IBASA LTDA
R. Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil

Importado y distribuido por:
NUVETEC S.R.L.
Av. José J. Sanches esq. 2 de Mayo.
Km 4. Ciudad del Este
Paraguay. Tel: (595) 61 578183
Responsable Técnica:
M. V. Andrea Bisolo - Reg: 1514

Distribuido por: **DIBASA S.R.L.**
San Martín c/ Pedro J. Caballero
Luque. Tel: 021 653135

REG. SENACSA: XXXXX