

IBATRIM ORAL



AVES E SUÍNOS
ANTIBACTERIANO



USO VETERINÁRIO

FÓRMULA: Cada 100 ml da suspensão contém:

Sulfadiazina sódica.....	40,0 g
Trimetoprim.....	8,0 g
Veículo q.s.p.	100,0 ml

INDICAÇÕES: Na cura de processos infecciosos causados por microorganismos sensíveis à associação Sulfadiazina-Trimetoprim, tais como:

AVES: Leucocitose (Leucocytozoon spp), colibacilose (*Escherichia coli*), cólera aviária (*Pasteurella multocida*), doença crônica respiratória (*Mycoplasma gallisepticum*), tifo aviário (*Salmonella gallinarum*).

SUÍNOS: Poliartrite infecciosa (*Haemophilus parasuis*), infecções estreptocócicas (*Streptococcus suis*, *Streptococcus equisimilis*), actinobacilose (*Actinobacillus suis*), rinite atrófica (*Bordetella bronchiseptica*), pasteurelose (*Pasteurella multocida*), pleuropneumonia (*Haemophilus pleuropneumonia*).

POSOLOGIA E MODO DE USAR: AGITAR BEM ANTES DE USAR. Ibatrim Oral Aves e Suínos deve ser diluído na água de bebida e fornecido aos animais de 5 a 7 dias. O tratamento deve continuar por um período de tempo não inferior a 48 horas após o desaparecimento dos sintomas e não mais do que 14 dias consecutivos.

AVES: Diluir 1 ml do produto em 2,5 litros de água ou 1 frasco de 20 ml em 50 litros ou 1 frasco de 200 ml em 500 litros.

SUÍNOS: Diluir 1 ml do produto em 2 litros de água ou 1 frasco de 20 ml em 40 litros ou 1 frasco de 200 ml em 400 litros.

CONTRAINDICAÇÕES: Ibatrim Oral Aves e Suínos é contraindicado para animais com grave insuficiência renal, deficientes em folatos e sensíveis à sulfadiazina ou trimetoprim.

EFEITOS COLATERAIS: Podem ocorrer erupções cutâneas, formação de cristais nos rins (cristalúria), principalmente em tratamentos mais prolongados. Em dias muito quentes, aumentar o aporte de água das aves para evitar intoxicação aguda, pelo aumento da concentração sanguínea de sulfas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

AVES: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

OVOS - OS OVOS DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVEM SER DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO 11 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. ANTES DESTA PERÍODO, OS OVOS DEVEM SER DESCARTADOS.

SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não associar à sulfadiazina medicamentos que contenham ácido para-aminobenzoico, devido ao antagonismo na ação antibacteriana. Não administrar concomitantemente com anticoagulantes (warfarina).

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SOB Nº 7519/00 EM 19/10/2000.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
MELISSA CRESTANI - CRF/RS 8153

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



LABORATÓRIO IBASA LTDA
Rua Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil
CNPJ: 91.850.875/0001-38
www.ibasa.com.br
SAC: 0800.5412137

IBATRIM ORAL



AVES E PORCINOS

ANTIBACTERIANO



USO VETERINARIO

FÓRMULA: Cada 100 ml del producto contiene:

Sulfadiazina sódica.....	40,0 g
Trimetoprim.....	8,0 g
Vehículo q.s.p.	100,0 ml

INDICACIONES: En la cura de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la asociación Sulfadiazina-Trimetoprim, tales como:

AVES: Leucocitoozoonosis (*Leucocytozoon spp*), colibacilosis (*Escherichia coli*), cólera aviaria (*Pasteurella multocida*), enfermedad crónica respiratoria (*Mycoplasma gallisepticum*), tífus aviaria (*Salmonella gallinarum*).

PORCINOS: Poliartritis infecciosa (*Haemophilus parasuis*), infecciones estreptocócicas (*Streptococcus suis*, *Streptococcus equisimilis*), actinobacilosis (*Actinobacillus suis*), rinitis atrófica (*Bordetella bronchiseptica*), pasteurelisis (*Pasteurella multocida*), pleuropneumonia (*Haemophilus pleuropneumonia*).

POSOLÓGIA Y MODO DE USO: AGITAR BIEN ANTES DE USAR. Ibatrim Oral Aves y Porcinos debe ser diluido en agua de bebida y provisto a los animales durante 5 a 7 días. El tratamiento debe continuar por un período de tiempo no inferior a 48 horas luego de la desaparición de los síntomas y en no más que 14 días consecutivos.

AVES: Diluir 1 ml del producto en 2,5 litros de agua o 1 frasco de 20 ml en 50 litros o 1 frasco de 200 ml en 500 litros.

PORCINOS: Diluir 1 ml del producto en 2 litros de agua o 1 frasco de 20 ml en 40 litros o 1 frasco de 200 ml en 400 litros.

CONTRAINDICACIONES: Ibatrim Oral Aves y Porcinos es contraindicado para animales con grave insuficiencia renal, deficientes en folatos y sensibles a la sulfadiazina o trimetoprim.

EFFECTOS COLATERALES: Pueden ocurrir erupciones cutáneas, formación de cristales en los riñones (cristaluria), principalmente en tratamientos más prolongados. En días muy calurosos, aumentar el aporte de agua de las aves para evitar intoxicación aguda por el aumento de la concentración sanguínea de sulfa.

ATENCIÓN: RESPETAR LOS SIGUIENTES PERÍODOS DE CARENCIA

AVES: MATANZA - LA MATANZA DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADA 5 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. HUEVOS - LOS HUEVOS DE LOS ANIMALES TRATADOS SÓLO DEBEN SER UTILIZADOS PARA CONSUMO HUMANO 11 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. ANTES DE ESTE PERÍODO, LOS HUEVOS DEBEN SER DESCARTADOS.

PORCINOS: MATANZA - LA MATANZA DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO DEBE SER REALIZADA 5 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN. EL USO DEL PRODUCTO EN DIFERENTES CONDICIONES DE CÓMO SE INDICA EN ESTE PROSPETO PUEDE CAUSAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS SUPERIORES A LOS LÍMITES APROBADOS, HACIENDO QUE EL ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL SEA INAPROPIADO PARA EL CONSUMO.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No asociar a la sulfadiazina medicamentos que contengan ácido paraaminobenzóico, debido al antagonismo en la acción antibacteriana. No administrar concomitantemente juntamente con anticoagulantes (warfarina).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en lugar seco y fresco, al abrigo de la luz solar y lejos del alcance de niños y animales. Almacenar entre 15° y 30°C.

VENTA BAJO RECETA DEL MÉDICO VETERINARIO.

Propietario y fabricante:
LABORATÓRIO IBASA LTDA
R. Almirante Tamandaré, 530
Porto Alegre - RS - Brasil

Importado y distribuido por:
NUVETEC S.R.L.
Av. José J. Sanches esq. 2 de Mayo.
Km 4. Ciudad del Este
Paraguay. Tel: (595) 61 578183
Responsable Técnica:
M. V. Andrea Bisolo - Reg: 1514

Distribuido por: **DIBASA S.R.L.**
San Martín c/ Pedro J. Caballero
Luque. Tel: 021 653135

REG. SENACSA: 14681