

# IBATRIM ORAL



CÃES E GATOS

ANTIBACTERIANO / AGITE ANTES DE USAR  
COM AROMA DE MORANGO



USO VETERINÁRIO

**FÓRMULA:** Cada 100 ml contém:

Sulfadiazina .....	20,00 g
Trimetoprim .....	4,00 g
Veículo q.s.p. ....	100,00 ml

**INDICAÇÕES:** No tratamento de processos infecciosos de cães e gatos causados pelos seguintes micro-organismos: Salmoneloses (*Salmonella spp*), toxoplasmose (*Toxoplasma gondii*), vaginites (*Escherichia coli*, *Brucella canis*), metrite aguda (*Escherichia coli*), mastite (*Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*), traqueobronquite infecciosa dos cães (*Bordetella bronchiseptica*), pneumonia (*Streptococcus spp*, *Pasteurella spp*), cistite (*Corynebacterium spp*).

**POSOLOGIA E MODO DE USAR:** Agitar bem antes de usar. Administrar via oral a cães e gatos na dose de 1 ml para cada 8 kg de peso (30 mg da associação/kg) a cada 12 ou 24 horas, dependendo da gravidade dos sintomas, durante cinco dias consecutivos. Continuar o tratamento até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas e não mais do que 14 dias consecutivos. Fornecer água em abundância aos animais para manter a hidratação e fluxo urinário e proporcionar a melhor absorção do medicamento.

PESO DO ANIMAL	DOSE DIÁRIA
2 kg	5 gotas
4 kg	10 gotas
6 kg	15 gotas
8 kg	1,0 ml (20 gotas)
10 kg	1,25 ml
16 kg	2,00 ml
20 kg	2,50 ml
32 kg	4,00 ml

Aconselha-se utilizar para animais de menor peso o frasco conta-gotas e para os maiores administrar com seringa dosadora.

**CONTRAINDICAÇÕES:** IBATRIM ORAL - Cães e Gatos é contra indicado para animais com grave insuficiência renal, deficientes em folatos e sensíveis a sulfadiazina ou trimetoprim.

**PRECAUÇÕES:** Não administrar o produto concomitantemente com anticoagulantes (Warfarina). Evitar tratamentos desnecessariamente prolongados a fim de impedir os eventuais efeitos colaterais.

**EFEITOS ADVERSOS:** Pode ocorrer hipersalivação em felinos após a administração do produto. Depressão da medula óssea, hepatite, icterícia, neurites periféricas, entre outros.

**CONSERVAÇÃO:** Conservar o produto em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,  
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SOB Nº 5984/97 EM 26/05/1997.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
MELISSA CRESTANI - CRF/RS 8153

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



LABORATÓRIO IBASA LTDA  
Rua Almirante Tamandaré, 530  
Porto Alegre - RS - Brasil  
CNPJ: 91.850.875/0001-38  
www.ibasa.com.br  
SAC: 0800.5412137

# IBATRIM ORAL



## PERROS Y GATOS

ANTIBACTERIANO; AGITE ANTES DE USAR  
CON AROMA DE FRUTILLA



## USO VETERINARIO

**FÓRMULA:** Cada 100 ml contiene:

Sulfadiazina .....	20,00 g
Trimetoprima .....	4,00 g
Vehículo q.s.p. ....	100,00 ml

**INDICACIONES:** En el tratamiento de procesos infecciosos de perros y gatos causados por los siguientes microorganismos: Salmonelosis (*Salmonella* spp), toxoplasmosis (*Toxoplasma gondii*), vaginites (*Escherichia coli*, *Brucella canis*), metrite aguda (*Escherichia coli*), mastitis (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp), traqueobronquite infecciosa de los perros (*Bordetella bronchiseptica*), neumonía (*Streptococcus* spp, *Pasteurella* spp), cistitis (*Corynebacterium* spp).

**POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:** Agitar bien antes de usar. Administrar por vía oral a perros y gatos en dosis de 1 ml para cada 8 kg de peso (30 mg de asociación/kg) cada 12 o 24 horas, dependiendo de la gravedad de los síntomas durante cinco días consecutivos. Continuar el tratamiento hasta 48 horas después de que desaparezcan los síntomas y no más que en 14 días consecutivos. Proveer agua en abundancia a los animales para mantener la hidratación y flujo urinario y proporcionar la mejor absorción del medicamento.

PESO DO ANIMAL	DOSE DIARIA
2 kg	5 gotas
4 kg	10 gotas
6 kg	15 gotas
8 kg	1,0 ml (20 gotas)
10 kg	1,25 ml
16 kg	2,00 ml
20 kg	2,50 ml
32 kg	4,00 ml

Se aconseja utilizar para animales de menor peso el frasco cuenta gotas y para los mayores administrar con jeringa dosificadora.

**CONTRAINDICACIONES:** IBATRIM ORAL - Perros y Gatos es contraindicado para animales con grave insuficiencia renal, deficientes en folatos y sensibles a la sulfadiazina o trimetoprima.

**PRECAUCIONES:** No administrar el producto conjuntamente con anticoagulantes (warfarina). Evitar tratamientos innecesarios prolongados a fin de impedir los eventuales efectos colaterales.

**EFFECTOS ADVERSOS:** Puede ocurrir hipersalivación en felinos leugo de administración del producto. Depresión de la médula ósea, hepatitis, ictericia, neuritis periféricas, entre otras.

**CONSERVACIÓN:** Conservar el producto en un lugar seco y fresco, al resguardo de la luz solar y fuera del alcance de niños y animales. Conservar entre 15° C y 30° C.

**VENTA BAJO RECETA Y APLICACIÓN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES  
DEL MÉDICO VETERINARIO.**

Propietario y fabricante:  
**LABORATORIO IBASA LTDA**  
R. Almirante Tamandaré, 530  
Porto Alegre - RS - Brasil

Importado y distribuido por:  
**NUVETEC S.R.L.**  
Av. José J. Sanches esq. 2 de Mayo.  
Km 4. Ciudad del Este  
Paraguay. Tel: (595) 61 578183  
Responsable Técnica:  
M. V. Andrea Bisolo - Reg: 1514

Distribuido por: **DIBASA S.R.L.**  
San Martín c/ Pedro J. Caballero  
Luque. Tel: 021 653135  
**REG. SENACSA: 13710**